

AIDS oder erworbenes Immunabwehr-Mangelsyndrom ist der Name des Krankheitskomplexes, welcher nach Infektion mit dem HI (Humanes Immundefizienz)-Virus droht. Es gibt verschiedene Therapieansätze, aber man muss feststellen, dass AIDS bis heute trotz aller medizinischen Fortschritte nicht heilbar ist.

Deshalb hat der Schutz vor Ansteckung nach wie vor den höchsten Stellenwert bei der Bekämpfung der Erkrankung. Wirksamstes Mittel ist die Verwendung des Kondoms. Neben HIV sind Gonorrhoe, Hepatitis, Chlamydieninfektionen und Lues weitere sexuell übertragbare Erkrankungen.

### Wie kann man sich mit HIV infizieren?

Hauptsächliche Übertragungswege sind:

- Ungeschützter Geschlechtsverkehr
- Blutkontakt mit infiziertem Blut

Wenn Sie sich doch einmal unsicher sind, kann man durch einen HIV- („AIDS“) Test mit hoher Sicherheit eine Infektion ausschließen.

### Wann wird der HIV-Test nach einer Infektion positiv?

Eine normale Immunantwort des Körpers vorausgesetzt, sind frühestens 4 bis 6 Wochen nach Infektion Antikörper gegen HIV im Blut nachweisbar. Diese ergeben dann im HIV-Test ein positives Ergebnis.

Bei einem sicheren Blutkontakt mit infiziertem Blut (z.B. Nadelverletzung) oder auf Ihren Wunsch kann man mit dem Virusnachweis (HIV-PCR) noch früher eine HIV-Infektion feststellen.

### Wie sicher ist der HIV-Test?

Die modernen Teste haben eine hohe Sensitivität. Das heißt, bei einem negativen Testausfall und normaler Immunantwort des Körpers kann man sich sehr sicher sein, keine Infektion zu haben. Mit dem Test werden sowohl Antikörper gegen die HIV-Typen I und II als auch ein Virusprotein (Antigen) nachgewiesen.

### Was mache ich, wenn ein Test positiv ist?

Bei positivem Testausfall muss in einer zweiten Blutprobe durch einen Bestätigungstest und den Nachweis der Viruszahl die HIV-Infektion gesichert werden. Die weitere medizinische Betreuung erfolgt dann in speziell qualifizierten Arztpraxen. Wenn Sie wissen wollen, wo sich diese befinden, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Hausarzt oder an uns. Auch im Internet sind Verweise zu finden.





### Ich möchte beim Test anonym bleiben. Ist dies möglich?

Der HIV-Test ist auf Ihren Wunsch auch anonym möglich. Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt. Auch bei uns im Institut für Medizinische Diagnostik ist jeden Werktag von 8 – 17 Uhr nach telefonischer Voranmeldung (030-770010) die Blutentnahme möglich.

### Wie lange muss ich auf das Ergebnis für den HIV-Test warten?

Spätestens am Folgetag nach der Blutabnahme liegt für den Suchtest Ihr Ergebnis im Labor vor.

überreicht durch:



Praxisstempel

#### Allgemeine Informationen

##### Für gesetzlich Versicherte:

Einige medizinische Leistungen können von den Krankenkassen nicht in jedem Fall übernommen werden und müssen deshalb vom Patienten selbst bezahlt werden. Ihr Haus- oder Facharzt entscheidet, welche ärztliche Leistung bei Ihnen kurativ erforderlich ist.

##### Für privat Versicherte:

Es erfolgt eine Kostenübernahme der privaten Krankenversicherung nach gültiger GOÄ, wenn kein vorheriger Leistungsausschluss bestand.

Falls Sie hierzu Fragen haben, wird Ihr Arzt Sie gerne beraten.

AIDS (HIV 1+2)-Test (EIA) im Serum (IGeL-Preis) 17,49 €  
 HIV 1-PCR im Plasma (IGeL-Preis) 128,23 €



**Institut für Medizinische Diagnostik MVZ GbR**  
 Nicolaistraße 22, 12247 Berlin (Steglitz)  
 Tel (030) 77 001 322, Fax (030) 77 001 332  
 Info@IMD-Berlin.de, www.IMD-Berlin.de



**Medizinisches Labor Potsdam MVZ GbR**  
 Friedrich-Ebert-Straße 33, 14469 Potsdam  
 Tel (0331) 28095 0, Fax (0331) 28095 99  
 Hygiene-Institut-Potsdam@t-online.de, www.medlab-pdm.de



Weitere Blutabnahmestellen finden Sie auf unserer Homepage.

## HIV-("AIDS") Test

Wenn man sich doch einmal unsicher ist

IGeL  
 Individuelle Gesundheitsleistungen